



Diagnóstico de adicción a las drogas en Sinaloa

12 a 65 años de edad

Estudio elaborado para
Fundación Sociedad
Educativa de Sinaloa, A.C.
Octubre 2021

Antecedentes y objetivos

- El documento que a continuación se presenta, contiene los resultados de un estudio realizado en seis ciudades de Sinaloa, durante las dos últimas semanas de agosto y las dos primeras semanas de septiembre de 2021.

Antecedentes:

- Sociedad Educadora busca desarrollar un programa para prevenir la adicción a las drogas, para lo cual requiere una base de información que le permita realizarlo de manera efectiva.
- De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de efectuar un diagnóstico que, sin tener el alcance de un censo, logre una aproximación a los distintos aspectos que configuran la situación actual de esa problemática.

Objetivo general:

- Obtener un diagnóstico sobre la situación de adicciones a drogas en las principales ciudades de Sinaloa, de tal manera que Sociedad Educadora cuente con elementos para desarrollar un programa de prevención.

Objetivos específicos:

- Identificar la droga de inicio por parte del grupo bajo análisis, además de las drogas puente.
- Conocer cuáles son las drogas que conoce o sabe que existen, y las que consume.
- Establecer la edad de inicio en el consumo.
- Determinar los niveles de consumo.
- Conocer los motivos por los que estas personas consumen drogas, buscando identificar patrones familiares o en el entorno.
- Establecer qué consecuencias ha tenido en su vida el consumo de drogas.

Nota metodológica

- Se aplicaron 510 encuestas a personas que tuvieran adicción al menos a una droga.
 - Para considerarse una entrevista válida, se determinó que la edad del encuestado fuera de 12 a 65 años.
 - En el caso de los menores de edad, se solicitó autorización a los padres.
 - La encuesta se realizó en los hogares de los sujetos bajo estudio, en las siguientes ciudades:
 - Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Navolato.
- Cabe destacar que, dadas las características del estudio y las condiciones que se viven con la violencia y pandemia, el muestreo aplicado fue no probabilístico. Esto es, no se llevó a cabo una selección de viviendas en base a una estratificación geográfica u otro tipo de mecánica similar.
- Por este motivo, el estudio toma como universo no la totalidad de habitantes de las ciudades consideradas, sino a los sujetos que son adictos a algún tipo de droga.
- En estricto sentido, la manera en que se realizó el estudio hace complicado asignar un margen de error al tamaño de muestra obtenido. De ser totalmente aleatoria, una muestra de este tipo implicaría un margen de error de $\pm 4.3\%$, dentro de un intervalo de confianza del 95%.
- A menos que se especifique otra cosa, los porcentajes expresados a lo largo del documento, son sobre el total de entrevistados. Cuando la suma de los porcentajes sea diferente a 100, se debe al redondeo.
- Para efectos de tener una referencia del porcentaje de la población que consume drogas, nos remitimos a los siguientes informes:
 1. Al Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México 2021, editado por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancia Psicoactivas. Secretaría de Salud y CONADIC.
 2. Encuesta nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, CONADIC y otros.

Revisar





Resultados de la encuesta



EG MKTG.


www.egmercadotecnia.com

Sociedad Educadora de Sinaloa


Diagnóstico de adicción a las drogas en Sinaloa

Perfil del entrevistado


Ciudad




Sexo




Edad




Estado civil



Nivel de escolaridad (último nivel terminado)




Cuenta con hijos




En el 60% de los casos, viven con el entrevistado. En promedio tienen 2 hijos (35% tiene 1; 39% tiene 2; 26% tiene al menos 3).

Personas que viven y que trabajan en su hogar



Ingreso familiar mensual (NSE)



Principal ocupación del entrevistado


| Ocupación | % | Ocupación | % | Ocupación | % | Ocupación | % |
|-----------------------------|-----|--------------------------|------|-------------------------|------|------------------|------|
| Empleado de empresa privada | 29% | Cocinero | 1% | Asesor de ventas | 0.2% | Matancero | 0.2% |
| Desempleado | 14% | Guardia de seguridad | 1% | Bodeguero | 0.2% | Militar | 0.2% |
| Albañil | 10% | Fierrero | 1% | Cantante | 0.2% | Músico | 0.2% |
| Estudiante | 9% | Lava carros | 1% | Carnicero | 0.2% | Nutriólogo | 0.2% |
| Comerciante | 6% | Maestro | 1% | Constructor | 0.2% | Panadero | 0.2% |
| Ama de casa | 4% | Obrero | 1% | Coordinadora de eventos | 0.2% | Paquetero | 0.2% |
| Mesero | 2% | Soldador | 1% | Dentista | 0.2% | Periodista | 0.2% |
| Chofer | 2% | Agricultor | 0.4% | Diseñador gráfico | 0.2% | Pintor | 0.2% |
| Plomero | 2% | Cajero | 0.4% | Diseño de modas | 0.2% | Prostituta | 0.2% |
| Repartidor | 1% | Cargador | 0.4% | Escritor | 0.2% | Recepcionista | 0.2% |
| Electricista | 1% | Carrocero | 0.4% | Ingeniero Industrial | 0.2% | Recursos humanos | 0.2% |
| Empresario | 1% | Fotógrafo | 0.4% | Instalador de servicios | 0.2% | Secretaria | 0.2% |
| Servicio de limpieza | 1% | Mecánico | 0.4% | Jornalero | 0.2% | Tablaroquero | 0.2% |
| Estilista | 1% | Operador de maquinaria | 0.4% | Jubilado | 0.2% | Tatuador | 0.2% |
| Hace mandados | 1% | Técnico en refrigeración | 0.4% | Lavaplatos | 0.2% | Taxista | 0.2% |
| Taquero | 1% | Actor | 0.2% | Limpia maleza | 0.2% | Trailero | 0.2% |
| Burócrata | 1% | Agente de ventas | 0.2% | Locutora de radio | 0.2% | No contestó | 0.4% |

Composición familiar y edad de quienes la integran / Edad de quienes consumen alguna droga en su hogar

¿Cómo se compone tu hogar actualmente?

(% del total de entrevistados)


n = 510



¿Cuál es la edad de quienes consumen alguna droga en tu hogar?

(% del total de entrevistados)

n = 510



En promedio, existen 1.2 adictos en cada hogar, incluyendo el entrevistado.


Se encontró que en el 80% de los hogares existe solo 1 adicto, mientras que en el 16% de los casos hay 2. Solo en el 4% de los hogares existen 3 personas con alguna adicción a alguna droga.

Persona con quien le agrada pasar la mayor parte de su tiempo

(% del total de entrevistados) **n = 510**


En la actualidad, ¿con quién te agrada pasar la mayor parte de tu tiempo, es decir, con quien convives más?

Respuesta espontánea




¿A quién le tienes más confianza para contarle lo que sientes, lo que te sucede?

Respuesta espontánea



¿Cuáles de estas personas te hacen sentir querido y valorado?

Respuesta asistida (se leyó cada opción)



Cuándo piensas en el futuro, ¿cuál es tu más grande sueño?

Factores de protección

(% del total de entrevistados)

Respuesta espontánea

n = 510

| Sueño | % | Sueño | % | Sueño | % |
|---|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Tener casa propia | 16% | Volver a ver a su hijo | 1% | Ser estrella porno | 0.2% |
| Estudiar / Tener una carrera | 10% | Independizarse | 1% | Ser famoso | 0.2% |
| Tener un negocio / Hacer crecer su negocio | 7% | Solo vivir | 1% | Ser médico | 0.2% |
| Casarse / Formar una familia | 7% | Conocer / Estar cerca de sus nietos | 0.4% | Ser músico | 0.2% |
| Superarse personalmente | 7% | Jubilarse / Pensionarse | 0.4% | Ser policía | 0.2% |
| Sacar adelante a su familia | 6% | Ser alguien importante | 0.4% | Ser Presidente de México | 0.2% |
| Dejar las drogas | 6% | Ser cantante profesional | 0.4% | Ser rector de la universidad | 0.2% |
| Darle estudios / Darle lo mejor a sus hijos | 6% | Ser enfermera | 0.4% | Ser un gran capo | 0.2% |
| Tener un empleo / Tener un mejor empleo | 5% | Ser maquillista profesional | 0.4% | Ser un tatuador reconocido | 0.2% |
| Tener estabilidad económica / Mejor calidad de vida | 4% | Ampliar su casa | 0.2% | Tener plaza de maestro | 0.2% |
| Comprar / Tener un auto | 4% | Comprar una casa a su mamá | 0.2% | Tener tranquilidad | 0.2% |
| Ver a su hijo(a) / hijos crecer | 2% | Escribir una novela | 0.2% | Tener un camión | 0.2% |
| Ser feliz / Ser feliz con su familia | 1% | Estar bien con sus hermanos | 0.2% | Tener un equipo de fotografía | 0.2% |
| Viajar | 1% | Estar con su familia | 0.2% | Tener una banda de músicos | 0.2% |
| Ser profesional en el deporte | 1% | Ganarse la lotería | 0.2% | Tocar en una buena banda | 0.2% |
| Ayudar a sus papás | 1% | Hacer los 15 años de su hija | 0.2% | Vivir solo con sus hijos | 0.2% |
| Ser abogado | 1% | Cambiar de ciudad | 0.2% | Ninguno, no tiene sueños | 2% |
| Ser mejor padre | 1% | Ser buena maestra | 0.2% | No sabe | 4% |

Lo que planea hacer para cumplir su sueño

Factores de protección

(% de quienes dijeron tener un sueño)

Respuesta espontánea

n = 479


| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|----------------------------------|-------------|--|------|
| Trabajar mucho | 35% | Buscar una casa | 0.4% | Emprender | 0.2% |
| Poner mayor esfuerzo / Más empeño | 12% | Comprar toda la herramienta | 0.4% | Enfocarse en lo que quiere | 0.2% |
| Rehabilitarse / Dejar las drogas | 11% | Portarse bien | 0.4% | Convivir con gente de ese medio | 0.2% |
| Estudiar mucho / Prepararse / Terminar la escuela | 10% | Elaborar un plan de crecimiento | 0.4% | No enfocarme en los problemas de otros | 0.2% |
| Apoyar / Darle lo mejor a su familia | 7% | Nada, ya perdió el tiempo | 0.4% | Pedir un préstamo | 0.2% |
| Ahorrar mucho | 5% | Apoyar a sus alumnos siempre | 0.2% | Ponerse a escribir | 0.2% |
| Buscar un empleo / Tener un mejor empleo | 4% | Casarse | 0.2% | Ser más aplicado | 0.2% |
| Encontrar una pareja | 2% | Comprar cachitos | 0.2% | Ser más responsable | 0.2% |
| Estar con sus hijos | 1% | Comprar lo que necesita | 0.2% | Ser mejor persona | 0.2% |
| Darle estudios / Educación a sus hijos | 1% | Cuidar a su pareja | 0.2% | Simplemente hacerlo | 0.2% |
| Juntar los puntos de Infonavit | 1% | Cuidarse él mismo | 0.2% | Trabajar en su cuerpo | 0.2% |
| Tener fuerza de voluntad | 1% | Darles mucho amor | 0.2% | No contestó | 4% |
| Hacer su trabajo bien | 1% | Dejar las malas amistades | 0.2% | | |

Actualmente, en tu trabajo o escuela te sientes ...

(% de quienes tienen una fuente de ingreso o estudian)

Respuesta asistida (se leyeron opciones)


n = 439



¿Practicas algún deporte?

(% del total de entrevistados)

n = 510




| Deporte | % | Deporte | % |
|------------|-----|----------|----|
| Fútbol | 62% | Pesas | 4% |
| Básquetbol | 9% | Caminar | 2% |
| Béisbol | 8% | Box | 1% |
| Voleibol | 7% | Crossfit | 1% |
| Correr | 4% | Softbol | 1% |


(% del total de entrevistados) **n = 510**

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)


En lo que va del año, ¿con qué frecuencia te has sentido triste?



En lo que va del año, ¿con qué frecuencia has sentido miedo o angustia?




En lo que va del año, ¿con qué frecuencia te has sentido desesperado?



¿En alguna ocasión has sentido o experimentado un cuadro de depresión?

(% del total de entrevistados)


n = 510



¿Con qué frecuencia lo ha sentido?

(% de quienes han sentido un cuadro de depresión)

n = 109




Con el mayor respeto posible permíteme preguntarte, ¿en algún momento de tu vida has tenido pensamientos suicidas o has intentado suicidarte?

(% del total de entrevistados)

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)

n = 510




¿Alguna vez has recibido algún tipo de ayuda profesional?

(% del total de entrevistados)

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)

n = 510



Solo 7 personas manifestaron haber recibido apoyo psiquiátrico. De este grupo, casi todos confirmaron haber llevado algún tratamiento médico. La mitad de quienes recibieron tratamiento médico fueron tratados con Clonazepam; el 17% con Diazepam, Oxcarbazepina, Prevalina, Quetiapina o Ritalín.

Ver cruce




Hablando de sustancias de consumo humano nocivas para la salud, ¿cuáles sabes que existen?
No me refiero a que las hubieras consumido, me refiero a que sepas de su existencia, aunque no
hayas tenido contacto con ellas.

Respuesta espontánea

(% del total de entrevistados)

n = 510




Nota: Los entrevistados mencionaron de distintas maneras a cada una de las sustancias que aparecen en el gráfico. Para efectos de conocer las respuestas de manera textual, se incluyen con el % que representa cada una de ellas.

¿Cuál fue la PRIMERA sustancia que consumiste?

(% del total de entrevistados)

Respuesta espontánea

n = 510




Ver cruce



¿Qué edad tenías cuando la consumiste por primera vez?

(% del total de entrevistados)

n = 510




Ver cruce



¿Cómo fue el primer consumo de esa sustancia?

(% del total de entrevistados)
 Respuesta asistida (se leyeron las opciones) **n = 510**



Ver cruce



¿Qué fue lo que te empujó a decidir probarla?

(% de quienes la consumieron por primera vez sin que alguien los obligara) *Respuesta espontánea* **n = 496**

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|---------------------------------|------|
| Curiosidad / Saber que se siente | 56% | Estrés | 1% |
| Por los amigos / quería encajar en un grupo / sentirse cool | 11% | Problemas económicos | 1% |
| Depresión / Estaba triste / Ansiedad | 8% | Falta de atención de su familia | 1% |
| Problemas familiares | 6% | Para bajar de peso | 1% |
| Falleció un familiar / amigo | 3% | Su pareja la consume | 1% |
| Quería tener energía | 3% | Baja autoestima | 0.4% |
| Olvidar sus problemas | 2% | Un familiar estaba enfermo | 0.4% |
| Se sentía solo | 2% | Abandono de mamá / papá | 0.2% |
| Relajarse / Tranquilizarse / Calmar sus nervios | 2% | Aburrimiento | 0.2% |
| Le decían cosas buenas / que la probara / que estaba buena | 2% | Sufrió una violación | 0.2% |
| Por diversión | 1% | Le gustó el olor | 0.2% |
| Terminó con su pareja | 1% | Se estaba divorciando | 0.2% |


De quienes fueron obligados, se la dieron sin darse cuenta o alguien le dijo que la probara, en el 71% de los casos, fue un amigo quien le ofreció o se la dio por primera vez. El 6% mencionó que fue por medio de un conocido; el 5% su pareja; el 5% un primo; y el 2% un tío. El 11% prefirió no responder.

¿Cuál fue la segunda droga que consumió?

(% del total de entrevistados)

Respuesta espontánea

n = 510




Tercera o más drogas que consumieron

(% del total de entrevistados)

Respuesta espontánea

n = 510

Sumatoria de la tercera, cuarta y quinta droga que consumieron.



¿Cuál fue la segunda droga que consumió?

(% de quienes consumieron primero cada una de las drogas)

Respuesta espontánea

| Marihuana n = 344 | | Cocaína n = 76 | | Cristal n = 33 | | Alcohol n = 22 | | Tabaco n = 15 | |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| | % | | % | | % | | % | | % |
| Ninguna otra | 57% | Ninguna otra | 64% | Ninguna otra | 64% | Tabaco | 36% | Marihuana | 60% |
| Cocaína | 22% | Marihuana | 16% | Marihuana | 27% | Cocaína | 27% | Cocaína | 20% |
| Cristal | 12% | Cristal | 11% | Cocaína | 6% | Marihuana | 23% | Alcohol | 7% |
| Pastillas | 5% | Pastillas | 4% | Metanfetaminas | 3% | Ninguna otra | 14% | Ninguna otra | 13% |
| Inhalantes | 1% | Alcohol | 3% | | | | | | |
| Metanfetaminas | 1% | Heroína | 3% | | | | | | |
| Jarabe | 1% | | | | | | | | |
| Alucinógenos | 0.3% | | | | | | | | |
| Polvo de Ángel | 0.3% | | | | | | | | |

| Pastillas n = 8 | | Inhalantes n = 4 | | Heroína n = 3 | |
|------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------|----------|
| | % | | % | | % |
| Marihuana | 38% | Cristal | 50% | Ninguna otra | 100% |
| Cocaína | 13% | Marihuana | 50% | | |
| Cristal | 13% | | | | |
| Metanfetaminas | 13% | | | | |
| Tabaco | 13% | | | | |
| Ninguna otra | 13% | | | | |


| Metanfetaminas n = 3 | | Polvo de Ángel n = 1 | | Jarabe n = 1 | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|
| | % | | % | | % |
| Ninguna otra | 100% | Metanfetaminas | 100% | Marihuana | 100% |

Tiempo que pasó entre el inicio del consumo de la primera y segunda droga


Desarrollo de la adicción

(% de quienes han consumido al menos 2 diferentes drogas) **n = 232**

¿Cuánto tiempo pasó para que probaras tu **SEGUNDA** droga?
Es decir, probaste la primera, y ¿cuánto tiempo pasó para que empezaras a probar la segunda?



En ese inter o periodo entre tu primera droga y la segunda, ¿hubo algún tiempo en el que dejaste de consumir la primera?




El 31% estuvo sin consumir menos de 6 meses antes de probar su segunda droga; 31% de 6 meses a 1 año, y el 20% más de 1 año. El 17% no recuerda cuánto tiempo pasó.

¿Cómo fue el primer consumo de esa segunda sustancia?

(% de quienes han consumido al menos 2 diferentes drogas)

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)

n = 232



¿Qué fue lo que te empujó a decidir probarla?

(% de quienes la consumieron sin que alguien los obligara) Respuesta espontánea

n = 231

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|---|------|
| Curiosidad / Saber que se siente | 54% | Fallecimiento de un familiar | 1% |
| Por los amigos / quería encajar en un grupo / sentirse cool | 10% | Falta atención de su familia | 1% |
| Quería tener energía | 5% | Problemas económicos | 1% |
| Probar algo nuevo | 5% | Relajarse / Tranquilizarse / Calmar sus nervios | 1% |
| Problemas familiares | 5% | Para bajar de peso | 0.4% |
| Depresión / Estaba triste / Ansiedad | 5% | Por diversión | 0.4% |
| Olvidar sus problemas | 4% | Presión en el trabajo | 0.4% |
| Probar algo más fuerte | 4% | Problemas emocionales | 0.4% |
| Se sentía solo | 3% | Rechazo de familiares | 0.4% |
| Le decían cosas buenas / que la probara / que estaba buena | 2% | No contestó | 3% |
| Terminó con su pareja | 2% | | |

(% del total de entrevistados)

n = 510


Respuesta espontánea

| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|---------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Nada, solo quiso probarla | 33% | Problemas económicos | 1% | Enfermedad de su mamá | 0.2% |
| Se sentía solo | 15% | Problemas emocionales | 1% | Lo obligaron | 0.2% |
| Depresión / Estaba triste | 11% | Dificultades de la adolescencia | 1% | Lo usó como medicina | 0.2% |
| Falleció un familiar / Amigo | 8% | Lo despidieron del trabajo | 1% | No podía decir que es gay | 0.2% |
| Por los amigos / Quería encajar en un grupo | 7% | Terminó con su pareja | 1% | No sabía qué estudiar | 0.2% |
| Problemas familiares | 7% | Su vida era aburrida | 0.4% | No tenía papá | 0.2% |
| Rechazo familiar / Falta de atención | 5% | Abandono de los padres | 0.4% | No tenía trabajo | 0.2% |
| Problemas con su pareja / Divorcio | 3% | Baja autoestima | 0.4% | Reprobó varias materias | 0.2% |
| Estrés | 1% | Estaba borracho | 0.4% | Se sentía gordo | 0.2% |
| Estaba cansado | 1% | Pelear con hermanos | 0.4% | Su hija estaba enferma de gravedad | 0.2% |
| Problemas en general | 1% | Presión en el trabajo | 0.4% | Tuvo un aborto | 0.2% |
| Sus papás se divorciaron | 1% | Violencia intrafamiliar | 0.4% | No recuerda | 2% |
| Estaba desesperado | 1% | Creía que se veía importante | 0.2% | | |

(% del total de entrevistados)

n = 510

Respuesta espontánea




Nota: Los entrevistados mencionaron de distintas maneras a cada una de las sustancias que aparecen en el gráfico. Para efectos de conocer las respuestas de manera textual, se incluyen con el % que representa cada una de ellas.

Actualmente, ¿cuáles son las drogas que **compras**?

(% del total de entrevistados)

n = 510

Respuesta espontánea



Ver cruce



Frecuencia de consumo y cantidad que compra cada vez que la usa

(% de quienes compran cada droga)

Marihuana *n* = 367

| Frecuencia | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|------------|-----|-------------|------|
| Diario | 36% | 1 bolsita | 23% | 2 g | 1% |
| 5 vxs | 1% | 100 g | 9% | 3 bolsitas | 1% |
| 4 vxs | 5% | 2 cigarros | 8% | 8 cigarros | 1% |
| 3 vxs | 17% | 5 cigarros | 6% | 1 g | 1% |
| 2 vxs | 15% | 3 cigarros | 5% | 10 cigarros | 1% |
| Cada semana | 16% | 1 cigarro | 5% | 16 g | 1% |
| Cada 15 días | 2% | 4 cigarros | 5% | 3 g | 1% |
| Cada mes | 2% | 15 g | 4% | 1 dosis | 0.3% |
| Cada 2 meses | 1% | 10 g | 3% | 150 g | 0.3% |
| No contestó | 6% | 6 cigarros | 3% | 23 cigarros | 0.3% |
| | | 30 g | 3% | 250 g | 0.3% |
| | | 2 bolsitas | 2% | 4 bolsitas | 0.3% |
| | | 50 g | 2% | 4 g | 0.3% |
| | | 20 g | 2% | 60 g | 0.3% |
| | | 200 g | 2% | No contestó | 8% |
| | | 5 g | 1% | | |

Alcohol *n* = 32

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 13% | 24 botes | 53% |
| Cada semana | 78% | 48 botes | 6% |
| Cada 15 días | 6% | 10 botes | 3% |
| No contestó | 3% | No contestó | 38% |

Cocaína *n* = 134

| Frecuencia | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|
| 5 vxs | 1% | 1 bolsita | 18% | 100 g | 1% |
| 4 vxs | 1% | 10 g | 14% | 1 g | 1% |
| 3 vxs | 10% | 1 g | 8% | 1/2 g | 1% |
| 2 vxs | 17% | 5 g | 7% | 2 bolsitas | 1% |
| Cada semana | 42% | 2 g | 5% | 2 porciones | 1% |
| Cada 15 días | 7% | 3 g | 4% | 29 g | 1% |
| Cada mes | 13% | 20 g | 4% | 4 g | 1% |
| No contestó | 10% | 8 g | 4% | 40 g | 1% |
| | | 15 g | 3% | 6 g | 1% |
| | | 3 bolsitas | 3% | No contestó | 15% |
| | | 5 bolsitas | 3% | | |
| | | 7 g | 3% | | |
| | | 200 g | 2% | | |

Cristal *n* = 107

| Frecuencia | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----|
| Diario | 41% | 1 bolsita | 41% | 150 g | 2% |
| 5 vxs | 1% | 2 bolsitas | 14% | 5 g | 2% |
| 4 vxs | 3% | 1 g | 8% | 6 bolsitas | 2% |
| 3 vxs | 12% | 2 g | 5% | 20 g | 1% |
| 2 vxs | 16% | 10 bolsitas | 4% | 3 g | 1% |
| Cada semana | 22% | 100 g | 4% | 300 g | 1% |
| Cada mes | 3% | 3 bolsitas | 3% | 50 g | 1% |
| No contestó | 2% | 1/2 g | 2% | 8 g | 1% |
| | | 10 g | 2% | No contestó | 6% |
| | | 15 g | 2% | | |

(% de quienes compran cada droga)

Tabaco *n* = 29

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|-------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 72% | 1 caja | 55% |
| 3 vxs | 3% | 2 cajas | 10% |
| Cada semana | 21% | 20 cigarros | 7% |
| Cada mes | 3% | 1 suelto | 3% |
| | | 3 cigarros | 3% |
| | | 5 cigarros | 3% |
| | | 6 cigarros | 3% |
| | | No contestó | 14% |

Pastillas *n* = 14

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 36% | 2 pastillas | 29% |
| 3 vxs | 14% | 5 pastillas | 21% |
| 2 vxs | 7% | 3 pastillas | 21% |
| Cada semana | 36% | 4 pastillas | 14% |
| Cada 15 días | 7% | 1 caja | 7% |
| | | No contestó | 7% |

Heroína *n* = 10

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|-------------|------|
| Diario | 30% | 10 bolsitas | 100% |
| 3 vxs | 20% | 10 g | 20% |
| 2 vxs | 20% | 3 g | 20% |
| Cada semana | 20% | 1 dosis | 10% |
| Cada 15 días | 10% | 2 bolsitas | 10% |
| | | 2 g | 10% |
| | | 20 g | 10% |
| | | 42 bolsitas | 10% |

Metanfetaminas *n* = 10

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|-------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 10% | 2 pastillas | 40% |
| 3 vxs | 10% | 1 dosis | 10% |
| 2 vxs | 20% | 1 g | 10% |
| Cada semana | 40% | 1 pastilla | 10% |
| No contestó | 20% | 2 g | 10% |
| | | No contestó | 20% |

Inhalantes *n* = 7

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|----------------|-----|
| Diario | 29% | 1 bote | 29% |
| 3 vxs | 14% | 1 lata | 29% |
| 2 vxs | 14% | 1 litro | 14% |
| Cada 15 días | 14% | 100 mililitros | 14% |
| Cada mes | 29% | No contestó | 14% |

Polvo de Ángel *n* = 2

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|------------|------|----------|------|
| Cada mes | 100% | 1 g | 100% |

Alucinógenos *n* = 1


| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|------------|------|-------------|------|
| Cada mes | 100% | 1 mililitro | 100% |

Jarabe *n* = 1

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|--------------|------|----------|------|
| Cada 15 días | 100% | 1 frasco | 100% |

¿Cuánto gastas en las drogas que compras?

(Promedio de quienes compran cada droga)




Considerando todas las drogas que compra, en promedio gastan \$201 cada vez que compra, lo que equivale a \$695 por semana.

Nota: Cuando el monto semanal es menor al monto de cada que compra, se debe a que compra cada mes o más a lo largo.

¿Alguien más te ofrece o invita?

(% del total de entrevistados)

n = 510



Ver cruce




¿Qué drogas te ofrecen o te invitan?

(% de quienes confirmaron que alguien le ofrece o le invita)

Respuesta espontánea

n = 127



(% de quienes mencionaron invitarle cada droga)

Marihuana n = 74

| Frecuencia | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 36% | 1 cigarro | 38% | 10 g | 3% |
| 3 vxs | 9% | 2 cigarros | 8% | 2 bolsitas | 3% |
| 2 vxs | 15% | 20 g | 8% | 3 cigarros | 3% |
| Cada semana | 30% | 1 bolsita | 5% | 30 g | 1% |
| Cada 15 días | 1% | 5 cigarros | 5% | 4 cigarros | 1% |
| Cada mes | 4% | 100 g | 4% | 6 cigarros | 1% |
| No contestó | 4% | 50 g | 4% | 9 cigarros | 1% |
| | | 1 g | 3% | No contestó | 11% |

Cristal n = 29

| Frecuencia | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 31% | 1 bolsita | 45% | 2 g | 3% |
| 3 vxs | 7% | 1 g | 10% | 50 g | 3% |
| 2 vxs | 7% | 2 bolsitas | 7% | 6 bolsitas | 3% |
| Cada semana | 38% | 1 dosis | 3% | 6 g | 3% |
| Cada 15 días | 7% | 10 g | 3% | 8 g | 3% |
| Cada mes | 3% | 100 g | 3% | No contestó | 10% |
| No contestó | 7% | | | | |

Cocaína n = 23

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|--------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 17% | 1 bolsita | 22% |
| 3 vxs | 4% | 10 g | 13% |
| 2 vxs | 4% | 2 g | 13% |
| Cada semana | 26% | 200 g | 9% |
| Cada 15 días | 4% | 5 g | 9% |
| Cada mes | 22% | 1 g | 4% |
| Cada 3 meses | 4% | 1 dosis | 4% |
| No contestó | 17% | 120 g | 4% |
| | | 2 bolsitas | 4% |
| | | 300 g | 4% |
| | | No contestó | 13% |

Tabaco n = 9

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|-------------|-----|-------------|-----|
| Diario | 67% | 5 cigarros | 22% |
| 2 vxs | 11% | 1 caja | 11% |
| Cada semana | 22% | 10 cigarros | 11% |
| | | 2 cigarros | 11% |
| | | 3 cigarros | 11% |
| | | No contestó | 33% |

Alcohol n = 8

| Frecuencia | % | Cantidad | % |
|-------------|-----|----------------|-----|
| Diario | 25% | 10 botes | 38% |
| Cada semana | 50% | 20 botes | 25% |
| Cada mes | 25% | 235 mililitros | 13% |
| | | 300 mililitros | 13% |
| | | No contestó | 13% |

(% de quienes mencionaron invitarle cada droga)

| Pastillas <i>n = 6</i> | | | |
|------------------------|-----|-------------|-----|
| Frecuencia | % | Cantidad | % |
| Diario | 33% | 2 pastillas | 33% |
| 2 vxs | 17% | 1 pastilla | 17% |
| Cada semana | 17% | 3 pastillas | 17% |
| Cada 15 días | 17% | 4 pastillas | 17% |
| Cada mes | 17% | No contestó | 17% |

| Heroína <i>n = 2</i> | | | |
|----------------------|------|----------|------|
| Frecuencia | % | Cantidad | % |
| Cada semana | 100% | 1 g | 100% |


| Alucinógenos <i>n = 1</i> | | | |
|---------------------------|------|----------|------|
| Frecuencia | % | Cantidad | % |
| Cada mes | 100% | 1 dosis | 100% |

| Jarabe <i>n = 1</i> | | | |
|---------------------|------|----------|------|
| Frecuencia | % | Cantidad | % |
| Cada semana | 100% | 1 frasco | 100% |

Para conseguir alguna droga, ¿alguna vez has tenido que hacer algo que te haya resultado difícil?

(% del total de entrevistados)


n = 510



¿Qué has hecho para conseguir drogarte?

(% de quienes han hecho algo difícil para drogarse)

n = 72



¿Qué tan frecuente o cada cuánto?

(% de quienes han hecho algo difícil para drogarse)


n = 72

| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|----------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-----|
| Cada que lo necesita | 19% | Cada mes | 4% | Solo 5 veces | 3% |
| Muy seguido | 3% | Cada 15 días | 1% | Pocas veces | 11% |
| Diario | 11% | Cada 2 meses | 1% | Antes / ya no lo hace | 11% |
| 2-3 veces por semana | 11% | Solo 2 veces | 6% | No contestó | 4% |
| Cada semana | 1% | Solo 1 vez | 13% | | |

Además de ti, ¿en tu familia hay alguien más que consume alguna droga?

(% del total de entrevistados)

n = 510




No se refiere a integrantes de su hogar, sino a otro familiar, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio.

¿Qué parentesco tienes con ese familiar?

(% de quienes tienen algún familiar que también consume drogas)

n = 128




Drogas que consumen sus familiares

Factores de riesgo

(% según el parentesco con el entrevistado)

| Hermano / Hermana n = 64 | % | Primo / Prima n = 32 | % | Esposo / Esposa n = 23 | % | Tío / Tía n = 15 | % | Cuñado / Cuñada n = 6 | % |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Marihuana | 77% | Cristal | 50% | Marihuana | 65% | Marihuana | 80% | Cristal | 67% |
| Cristal | 25% | Marihuana | 50% | Cristal | 17% | Cristal | 20% | Marihuana | 50% |
| Cocaína | 13% | Cocaína | 13% | Cocaína | 13% | Inhalantes | 13% | Cocaína | 17% |
| Alcohol | 2% | Alcohol | 6% | Alcohol | 9% | Cocaína | 7% | | |
| | | Tabaco | 6% | Heroína | 4% | | | | |
| | | Heroína | 3% | Inhalantes | 4% | | | | |
| | | Inhalantes | 3% | | | | | | |
| | | Pastillas | 3% | | | | | | |
| Hijo / Hija n = 6 | % | Sobrino / Sobrina n = 4 | % | Mamá n = 2 | % | Papá n = 2 | % | Padastro / Madrastra n = 1 | % |
| Marihuana | 67% | Marihuana | 75% | Marihuana | 50% | Marihuana | 100% | Alcohol | 100% |
| Alcohol | 17% | Cristal | 25% | Alcohol | 50% | | | Tabaco | 100% |
| Cocaína | 17% | | | | | | | | |
| Cristal | 17% | | | | | | | | |
| No contestó | 17% | | | | | | | | |

(% según el parentesco con el entrevistado)



¿Cuáles son los efectos nocivos que sabes que pueden causar el uso de drogas?

Factores de riesgo

(% del total de entrevistados)

n = 510


Respuesta espontánea

| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|---------------------------------------|----|-----------------------|----|------------------------|------|
| Alucinaciones | 30% | Depresión | 5% | Insuficiencia renal | 2% | Temblor de cuerpo | 1% |
| Problemas cardiacos / Hipertensión / Infartos / Taquicardia | 22% | Sueño | 5% | Derrame cerebral | 2% | Daño emocional | 0.4% |
| Dolor de cabeza | 17% | Convulsiones | 4% | Enfermedades crónicas | 2% | Desinterés | 0.4% |
| Cáncer | 13% | Desesperación | 4% | Desmayo | 1% | Desorientación | 0.4% |
| Muerte | 12% | Enfermedades en general | 4% | Cirrosis | 1% | Dolores en general | 0.4% |
| Insomnio / Somnolencia | 12% | Dolor de cuerpo / Huesos | 3% | Desconfianza | 1% | Enajenación | 0.4% |
| Locura | 11% | Inconsciencia | 3% | Embolia | 1% | Escalofríos | 0.4% |
| Adicción / Dependencia | 11% | Ojos rojos | 3% | Vértigo | 1% | Pérdida de dientes | 0.4% |
| Daño mental | 11% | Pérdida de peso | 3% | Cambios de humor | 1% | Anemia | 0.2% |
| Pérdida de memoria | 10% | Diarrea | 3% | Deshidratación | 1% | Ceguera | 0.2% |
| Ansiedad | 10% | Hiperactividad / Energía / Adrenalina | 2% | Esterilidad | 1% | Coma | 0.2% |
| Nerviosismo | 10% | Alteraciones en general | 2% | Intoxicación | 1% | Crecimiento de la cara | 0.2% |
| Problemas respiratorios / Tos / Asma / Neumonía | 10% | Calentura / Fiebre | 2% | Ataques epilépticos | 1% | Desgaste muscular | 0.2% |
| Hambre / Aumento del apetito | 9% | Falta de concentración | 2% | Disfunción eréctil | 1% | Desnutrición | 0.2% |
| Vómito | 8% | Sudor frío | 2% | Dolor de estómago | 1% | Entumecimiento | 0.2% |
| Delirio / Desvarío / Paranoia / Esquizofrenia | 7% | Debilidad / Cansancio / Flojera | 2% | Incapacidad | 1% | Impertinencia | 0.2% |
| Mareo | 7% | Mala conducta | 2% | Irritación | 1% | Pérdida de cabello | 0.2% |
| Agresividad / Ira / Enojo | 6% | Estrés | 2% | Palidez | 1% | Ninguno | 1% |
| Pérdida del apetito | 6% | Excitación | 2% | Parálisis | 1% | No sabe | 3% |

¿Has sufrido alguno de esos efectos?

(% del total de entrevistados)

n = 510



¿Cuáles has sufrido?

(% de quienes han tenido o sentido algún efecto)

n = 270

Respuesta espontánea

| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|---|----|--------------------------|------|
| Alucinaciones | 26% | Mala conducta | 3% | Cambios de humor | 1% |
| Insomnio / Somnolencia | 22% | Sudor frío | 3% | Desmayo | 1% |
| Dolor de cabeza | 13% | Exitación | 3% | Disfunción eréctil | 1% |
| Adicción / Dependencia | 11% | Convulsiones | 3% | Pérdida de peso | 1% |
| Hambre / Aumento del apetito | 10% | Estrés | 3% | Parálisis | 1% |
| Ansiedad | 9% | Debilidad / Cansancio / Flojera | 2% | Temblor de cuerpo | 1% |
| Vómito | 9% | Problemas respiratorios / Tos / Asma / Neumonía | 2% | Daño mental | 0.4% |
| Problemas cardiacos / Hipertensión / Infartos / Taquicardia | 8% | Inconsciencia | 2% | Deshidratación | 0.4% |
| Nerviosismo | 6% | Calentura / Fiebre | 1% | Desinterés | 0.4% |
| Pérdida del apetito | 6% | Diarrea | 1% | Desorientación | 0.4% |
| Agresividad / Ira / Enojo | 6% | Hiperactividad / Energía / Adrenalina | 1% | Dolor de cuerpo / Huesos | 0.4% |
| Mareo | 6% | Vértigo | 1% | Enajenación | 0.4% |
| Delirio / Desvarío / Paranoia / Esquizofrenia | 5% | Alteraciones en general | 1% | Intoxicación | 0.4% |
| Desesperación | 4% | Desconfianza | 1% | Ojos rojos | 0.4% |
| Pérdida de memoria | 4% | Falta de concentración | 1% | No contestó | 4% |
| Depresión | 3% | Locura | 1% | | |

De esos efectos que has sufrido, ¿cuál consideras que ha sido el peor?

(% de quienes han tenido o sentido algún efecto)

n = 270

Respuesta espontánea


| Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|---------------------------------|------|
| Alucinaciones | 18% | Debilidad / Cansancio / Flojera | 1% |
| Ninguno ha sido fuerte | 9% | Calentura / Fiebre | 1% |
| Insomnio / Somnolencia | 7% | Desesperación | 1% |
| Adicción / Dependencia | 7% | Falta de concentración | 1% |
| Problemas cardiacos / Hipertensión / Infartos / Taquicardia | 6% | Hambre / Aumento del apetito | 1% |
| Ansiedad | 5% | Inconsciencia | 1% |
| Nerviosismo | 4% | Mareo | 1% |
| Dolor de cabeza | 4% | Pérdida del apetito | 1% |
| Vómito | 4% | Sudor frío | 1% |
| Delirio / Desvarío / Paranoia / Esquizofrenia | 3% | Daño mental | 0.4% |
| Agresividad / Ira / Enojo | 3% | Desmayo | 0.4% |
| Depresión | 3% | Desorientación | 0.4% |
| Mala conducta | 2% | Disfunción eréctil | 0.4% |
| Todos | 2% | Exitación | 0.4% |
| Pérdida de memoria | 2% | Intoxicación | 0.4% |
| Problemas respiratorios / Tos / Asma / Neumonía | 2% | No contestó | 7% |
| Convulsiones | 1% | | |

¿Consideras que el consumo de drogas te ha afectado de manera social, familiar o en tus relaciones de pareja?

Factores de riesgo

(% del total de entrevistados)

n = 510



Manera como ha afectado en cada uno de los aspectos

(% de quienes dijeron haberle afectado en cada aspecto)

Respuesta espontánea

| Entorno familiar n = 293 | % |
|--|------|
| Discusiones / Enojos / Regaños | 32% |
| Problemas en general | 20% |
| A su familia no le gusta / Se molestan | 11% |
| Rechazo | 10% |
| Iniciativa propia de alejamiento | 4% |
| Se alejan / Le dejan de hablar | 4% |
| Desconfianza | 3% |
| Mal comportamiento | 3% |
| Descuido familiar | 2% |
| Lastima / Le hace daño a su familia | 2% |
| Lo corren de su casa | 2% |
| Le quitaron a su hijo / No convive con ellos | 2% |
| Divorcio | 1% |
| No apoya a sus hijos | 1% |
| Preocupaciones | 1% |
| Distracción | 0.3% |
| Estado emocional | 0.3% |
| Falta de respeto hacia su familia | 0.3% |
| Le esconden sus pertenencias | 0.3% |
| Lo quieren meter a un centro de rehabilitación | 0.3% |
| Mal ejemplo para sus hijos | 0.3% |
| Vergüenza | 0.3% |

| Relaciones de pareja n = 118 | % |
|---------------------------------|-----|
| Discusiones / Enojos | 60% |
| Divorcio | 17% |
| Problemas en general | 5% |
| No encuentra pareja | 5% |
| A su pareja no le gusta | 3% |
| Rechazo | 3% |
| Le dejan de hablar | 2% |
| Desconfianza | 1% |
| Falta de comprensión | 1% |
| Golpes | 1% |
| Inventan cosas | 1% |
| Ninfomanía | 1% |
| No llega a dormir | 1% |

| Entorno laboral n = 117 | % |
|--------------------------------|-----|
| No se presenta | 33% |
| Despido | 25% |
| Menor rendimiento | 15% |
| No encuentra trabajo | 7% |
| Discusiones / Enojos / Regaños | 6% |
| Problemas en general | 3% |
| Le llaman la atención | 3% |
| Llega tarde | 3% |
| Mala conducta | 2% |
| Se droga en el trabajo | 2% |
| Desesperación | 1% |

| Académicamente n = 39 | % |
|----------------------------------|-----|
| Bajó en calificaciones / Reprobó | 36% |
| Dejó la escuela | 31% |
| Falta / faltaba mucho a clases | 15% |
| Falta de concentración | 13% |
| Lo expulsaron de la escuela | 3% |
| Vendía droga en la escuela | 3% |


| Con amistades n = 117 | % |
|--|-----|
| Se alejaron / Le dejaron de hablar | 67% |
| Discusiones / Enojos / Regaños | 22% |
| Rechazo | 7% |
| Aislamiento / Iniciativa propia de alejamiento | 4% |

Quienes de manera espontánea mencionaron haberle afectado de manera social en general y en tiendas o establecimientos, manifestaron que han sido rechazados de ciertos lugares por su adicción a las drogas.

Cuando consumes, ¿ingieres alimentos?

(% del total de entrevistados)

n = 510



¿Qué alimentos ingieres?

(% de quienes ingieren alimentos)

n = 277


Respuesta espontánea

| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|------------------------------|-----|---------------------|------|-------------|------|
| Botanas en general | 19% | Café | 1% | Ceviche | 0.4% |
| De todo / Lo que sea | 17% | Vino | 1% | Chilaquiles | 0.4% |
| Comida / Lo que haya en casa | 16% | Arroz | 1% | Chocolate | 0.4% |
| Refresco | 9% | Jugo | 1% | Hamburguesa | 0.4% |
| Pan | 9% | Torta | 1% | Huevos | 0.4% |
| Cerveza | 8% | Bebidas alcohólicas | 1% | Licuado | 0.4% |
| Sabritas | 8% | Cacahuates | 1% | Maruchan | 0.4% |
| Frutas | 5% | Hot-Dog | 1% | Nieve | 0.4% |
| Frijol | 3% | Huevo | 1% | Pastel | 0.4% |
| Galletas | 3% | Tortillas | 1% | Pescado | 0.4% |
| Agua | 2% | Cosas dulces | 1% | Pizza | 0.4% |
| Carnes | 2% | Brownie | 0.4% | Quesadillas | 0.4% |
| Sopa | 2% | Caldo | 0.4% | Red Bull | 0.4% |
| Tacos | 2% | Carne asada | 0.4% | Suero | 0.4% |
| Pollo | 2% | Cereal | 0.4% | Whisky | 0.4% |

Sin importar lo que hayas hecho y con el mayor respeto y discreción te pregunto, ¿has cometido algún tipo de delito influenciado por las drogas?

(% del total de entrevistados)

$n = 510$




Ver cruce



A consecuencia de ese o esos delitos, ¿cuentas con antecedentes penales?

(% de quienes han cometido algún delito)

$n = 79$



Representa 5% del total de entrevistados.

Ver cruce




¿Cuáles son los delitos que has cometido?

(% de quienes han cometido algún delito baja la influencia de las drogas)

n = 510

Respuesta espontánea




Nota: Esta pregunta fue casi al final del cuestionario, una vez que el entrevistado sintiera mayor confianza, pero dado que es un factor de riesgo, se muestra en esta sección.

A consecuencia de las drogas que has consumido, ¿has sido hospitalizado(a) en alguna ocasión? Me refiero a estar en un hospital, no a una clínica de rehabilitación.

(% del total de entrevistados)


n = 510



¿Cuántas veces ha estado hospitalizado?

(% de quienes han estado hospitalizados)


n = 51



Ver cruce




Durante el tiempo que tienes consumiendo drogas ¿alguna vez has intentado abstenerte o dejar de consumirlas?




¿Cuántas veces ha intentado abstenerse?

(% de quienes han intentado abstenerse)



¿Cuál ha sido el periodo más largo que has pasado sin consumir drogas?

(% de quienes han intentado abstenerse)




Principal razón por la que no ha podido dejar de consumir drogas



Hablando específicamente de centros o clínicas de rehabilitación, ¿alguna vez has estado internado en alguno de estos lugares?

(% del total de entrevistados)

n = 510




Ver cruce



¿Cuántas veces ha estado internado?

(% de quienes han estado internados)

n = 79



¿Cómo fue el proceso de internamiento?

(% de quienes han estado internados)

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)

n = 79



Lugares en los que se ha internado

(% de quienes han estado internados)

n = 79


Respuesta espontánea

| Lugar | % | Lugar | % |
|--|----|--|----|
| Amistad | 9% | Centro Contra Adicciones | 1% |
| Jóvenes Unidos | 9% | Centro El Trébol | 1% |
| UCRAD | 9% | Centro de Ayuda Universal Santuario de la Fe | 1% |
| Nueva Esperanza | 8% | Centro de Rehabilitación Cereda | 1% |
| CRREAD | 7% | Centro de Rehabilitación y Reinserción Social VIDA | 1% |
| Drogadictos Unidos en Liberación | 6% | El Milagro Continúa | 1% |
| Grupo Unidos Por Una Nueva Vida | 6% | De Vuelta a Tu Vida | 1% |
| Esperanza de Culiacán | 5% | Hermanos Unidos Contra Las Drogas | 1% |
| Abath | 4% | Hospital Psiquiátrico de Culiacán | 1% |
| Centro de Rehabilitación Una Luz en El Camino | 4% | Jóvenes Renacidos | 1% |
| Centro de Rehabilitación Vida y Esperanza | 4% | Jesucristo es Nuestro | 1% |
| Clínica Libérate | 4% | Nuevo Amanecer | 1% |
| Amigos Para Siempre | 3% | Providencia | 1% |
| Centro de Integración Juvenil | 3% | Un Día Nuevo | 1% |
| Centro de Rehabilitación de Adicciones | 3% | Un Día a La Vez | 1% |
| Clínica Renacimiento | 3% | Un Milagro de Esperanza | 1% |
| Clinica de Tratamiento en Adicciones Retomando el Camino | 3% | Vive Sin Drogas | 1% |
| Cristo Vive | 3% | Vive y Deja Vivir | 1% |
| Fuerza y Voluntad | 3% | No recuerda el nombre | 4% |
| Sí Se Puede | 3% | | |

¿Le recomendarías a alguien que tome la decisión de internarse por cuenta propia?

(% de quienes han estado internados)

n = 79



¿Por qué le recomendaría a alguien internarse por cuenta propia?

(% de quienes han estado internados y le recomendarían a alguien internarse por cuenta propia)

n = 62

| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|--|-----|--|----|-----------------------------|----|
| Ayuda a dejar las drogas, lo apoyan para rehabilitarse | 45% | Te hablan / enseñan sobre el daño que causa las drogas | 5% | Evitar consecuencias | 2% |
| Para que no le ingresen a la fuerza | 6% | Para mejorar su salud / Te desintoxicas | 5% | Funciona | 2% |
| Dan un buen trato | 5% | Es lo mejor | 3% | Tener una mejor vida | 2% |
| Para mejorar su conducta | 5% | Reflexionas sobre los errores / piensas diferente | 3% | No está bien drogarse | 2% |
| Puede salir a la calle a hacer servicios | 5% | Cuando estás limpio invitas a otras personas | 2% | Escuchar la palabra de Dios | 2% |
| Te enseña a valorar | 5% | Depende de lo que haga | 2% | Pones de tu parte | 2% |

¿Por qué le NO recomendaría a alguien internarse por cuenta propia?

(% de quienes han estado internados y NO le recomendarían a alguien internarse por cuenta propia)


n = 17

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|--------------------------------|-----|-----------------------|----|
| Recibes maltrato | 41% | Cada persona decide | 6% |
| No sirve si no quieres cambiar | 29% | Es adicción | 6% |
| Es muy feo | 12% | Sufres de abstinencia | 6% |

¿Alguna vez te has sentido mal o culpable por usar drogas?

(% del total de entrevistados)

n = 510



¿Por qué razón ha sentido culpa?

(% de quienes se han sentido mal o culpable por usar drogas)

n = 321

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|--|------|
| Causa problemas o conflictos familiares / De pareja | 18% | Miedo a la adicción | 1% |
| Causa sufrimiento a la familia / A la pareja | 15% | No puede cumplir sus metas | 1% |
| Se afecta a sí mismo | 7% | A sus hijos no les gusta | 1% |
| Afecta / daña su salud | 7% | No deja de ser droga | 1% |
| Es una adicción | 6% | Rechazo familiar | 1% |
| No es bueno para su vida | 4% | Se alejó de su familia | 1% |
| Preocupaciones para su familia | 4% | Mal comportamiento / Pierde el control | 1% |
| Pierde / Descuida su trabajo | 4% | Descuida la escuela | 1% |
| Pierde / No puede ver a su familia | 3% | Se desvela | 1% |
| Mal ejemplo para su familia | 3% | Pierde todo | 1% |
| Descuida a su familia | 2% | Soledad | 1% |
| Desconfianza en él | 2% | Es otra persona | 1% |
| Pierde a su pareja | 2% | Daño emocional | 0.3% |
| Se alejan / Le dejan de hablar | 2% | Lo corren de su casa | 0.3% |
| Su familia se decepciona de él | 2% | Piensa en sus hijos | 0.3% |
| Arrepentimiento / Remordimiento | 1% | Se desespera | 0.3% |
| Gasto innecesario | 1% | No contestó | 3% |
| Gusto culposo | 1% | | |

¿Por qué razón NO ha sentido culpa?

(% de quienes NO se han sentido mal o culpable por usar drogas)

n = 189


| Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|--------------------------------|----|
| Le gusta hacerlo / se relaja / se siente bien / se divierte | 41% | Se daña él mismo | 1% |
| No afecta / No le hace daño a nadie / no se daña | 20% | Cada quien sabe lo que hace | 1% |
| Consume poco / Se sabe controlar | 9% | Consume con su pareja | 1% |
| No lo ve mal | 7% | Controlan su estado de ánimo | 1% |
| Se olvida de sus problemas | 5% | Le da igual | 1% |
| No tiene mal comportamiento | 3% | Más saludable que un cigarro | 1% |
| Es una adicción | 3% | Su familia no sabe que consume | 1% |
| El daño a él mismo | 1% | No contestó | 8% |

¿Qué drogas NUNCA consumirías?

(% del total de entrevistados)

n = 510

Respuesta espontánea



¿Qué opinas de las personas que usan esas drogas que no consumirías?

(% del total de entrevistados)

n = 510

Respuesta espontánea


| Respuesta | % | Respuesta | % | Respuesta | % |
|--|-----|------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Está mal / Es malo | 20% | No le gustaría consumirlas | 2% | Cambia su estado de ánimo | 0.3% |
| Se hacen daño | 18% | No piensan lo que hacen | 2% | Están en onda | 0.3% |
| Cada quien sabe lo que hace | 17% | Deberían saber los efectos | 2% | Les falta fuerza de voluntad | 0.3% |
| Son drogas muy fuertes | 12% | Les gusta | 2% | Gente ordinaria | 0.3% |
| Quedan mal / Se vuelven locos / Daño mental | 10% | No se preocupan | 2% | Huele mucho | 0.3% |
| Viven menos | 7% | Le dan lástima | 2% | No las conoce | 0.3% |
| Es lo peor / Lo más bajo / Lo más feo | 6% | Son débiles | 1% | Pierden todo | 0.3% |
| Están en problemas / Están muy perdidos | 6% | Deben buscar ayuda | 1% | Son muy caras | 0.3% |
| No valoran su vida | 4% | Deben ser internadas | 1% | Sufren mucho | 0.3% |
| Son valientes al consumir | 4% | Personas con baja autoestima | 1% | Que tengan cuidado | 0.3% |
| Deben consumirlas moderadamente | 4% | Pierden la memoria | 1% | Tienes alucinaciones | 0.3% |
| Que ya no lo hagan / No deberían consumirlas | 4% | No piensan en los demás | 1% | Trae consecuencias | 0.3% |
| Contraen enfermedades | 3% | No vale la pena | 1% | No contestó / No puede opinar | 22% |
| Acaban con su vida | 3% | Aguantan las drogas | 0.3% | | |
| Se vuelve adicción | 3% | Que busquen a Dios | 0.3% | | |

Si pudieras ayudar a alguien a salir de este problema, ¿a quién ayudarías?


(% del total de entrevistados)

n = 510

Respuesta espontánea



Si a tus 6 u 8 años hubieses tenido el apoyo de un programa que se enfocara a la atención de tus emociones, el cual te facilitara a enfrentar tus decisiones, ¿crees que habría sido de ayuda para que pudieras evitar el consumo de drogas?



¿Por qué sí? (% de quienes consideran que sí les hubiera sido de ayuda) n = 310

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|--|-----|---------------------------------------|------|
| Hubiera podido evitar / prevenir las drogas | 22% | Iría por un mejor camino | 1% |
| Hubiera sabido / Entendido las consecuencias | 19% | Toda ayuda es buena | 1% |
| Tomaría mejores decisiones | 10% | Apoyo para los que no tienen recursos | 0.3% |
| Pensaría diferente | 10% | Atención personalizada | 0.3% |
| Hubiera sido de ayuda, sin especificar | 5% | Recibiría consejos | 0.3% |
| Estaría mejor informado | 5% | Debería ser a toda la familia | 0.3% |
| Cualquier orientación es buena | 3% | Entender que es una adicción | 0.3% |
| Solucionaría sus problemas | 3% | Evitar depresión | 0.3% |
| Tendría mejor orientación | 3% | Las personas débiles necesitan ayuda | 0.3% |
| No se sentiría solo | 2% | Podría lograr sus metas | 0.3% |
| Es necesario | 2% | Por lo que sienten se drogan | 0.3% |
| Ayudaría con lo que piensa o siente | 2% | Prevenir problemas de salud | 0.3% |
| Fuera otra persona | 1% | Salvaría vidas | 0.3% |
| Ayuda a la educación | 1% | Sentiría seguridad | 0.3% |
| Hubiera sido diferente | 1% | Sería algo innovador para su familia | 0.3% |
| Sería más fácil expresarse | 1% | No sabe | 4% |

¿Por qué no? (% de quienes consideran que no les hubiera sido de ayuda) n = 200

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|---|-----|-------------------------------------|----|
| No ayuda / También consumiría | 26% | Quería probar | 1% |
| Cada quien toma sus decisiones conforme crece | 25% | Caes en tentación | 1% |
| Es una adicción | 8% | Consumir no lo hace mala persona | 1% |
| Cuando te drogas no piensas en nada | 5% | Depende de la fuerza de voluntad | 1% |
| Los problemas influyen | 5% | Depende de las emociones personales | 1% |
| Como adulto piensas diferente | 3% | Ese era su destino | 1% |
| Le gusta consumirla | 2% | Está bien, pero sin excederse | 1% |
| Las drogas las encuentras en cualquier lado | 2% | La adicción es debido a su tristeza | 1% |
| Siempre tuvo información y no le sirvió | 2% | La mayoría consume por gusto | 1% |
| Tomas las decisiones en el momento | 2% | Lo hace por diversión | 1% |
| Ya todos saben las consecuencias | 2% | Lo obligaron a consumir | 1% |
| A esa edad no entendería | 1% | No consume tanto | 1% |
| Consume por pérdida de un familiar | 1% | No serviría para expresarse | 1% |
| Es común consumir drogas | 1% | No tiene problemas | 1% |
| Es mejor de los 16 en adelante | 1% | Pensaría más en usar drogas | 1% |
| Las malas amistades influyen | 1% | Se te olvida con el tiempo | 1% |
| No le hizo falta | 1% | No sabe | 7% |

Desde tu experiencia, ¿qué recomendarías para que niños, jóvenes y adultos eviten el uso de drogas?

Factores de riesgo

(% del total de entrevistados)

n = 510

Respuesta espontánea

| Respuesta | % | Respuesta | % |
|--|-----|--------------------------------------|------|
| No consumir / No caer en tentación, sin especificar | 28% | Hacer caso a los padres | 1% |
| Alejarse de las personas que les ofrezcan drogas / Alejarse de malas amistades | 13% | No dejarse influenciar por los demás | 1% |
| Informarse sobre las consecuencias / Saber que es malo / Saber que destruyen | 12% | Cuidarse | 1% |
| Buscar apoyo | 5% | Distraerse en lo que les gusta | 1% |
| Practicar deporte | 4% | Evitar problemas | 0.4% |
| No dejar de estudiar | 3% | Pensar en que dañan a la familia | 0.2% |
| Que los padres atiendan a sus hijos | 3% | Dejar de vender droga | 0.2% |
| Acercamiento con los padres / Comunicación familiar | 3% | Mejorar la educación familiar | 0.2% |
| Nada | 3% | Saber que la soledad es fea | 0.2% |
| Platicar sus problemas / Expresar lo que sienten | 3% | Le da igual | 0.2% |
| Campañas para evitar el consumo de drogas | 2% | Mejorar autoestima | 0.2% |
| No lo hagan por curiosidad | 2% | Las drogas no deberían existir | 0.2% |
| Recibir consejos / Escuchar a los demás | 2% | Pensar en su futuro | 0.2% |
| Tomar buenas decisiones | 1% | No sabe | 10% |
| Cada quien toma sus decisiones | 1% | | |

Se leyó cada enunciado y se pidió calificar

Nivel de influencia promedio,
donde 0 es nada y 10 es mucho

Se leyó cada situación al entrevistado

n = 510



Ver cruce



Conclusiones



EGMKTG.

www.egmercadotecnia.com

Sociedad Educadora de Sinaloa
Diagnóstico de adicción a las drogas en Sinaloa

Lo más relevante de lo encontrado en la encuesta

- Perfil del encuestado:
 - Edad promedio: 34 años.
 - 67% son de sexo masculino.
 - En su mayoría son solteros.
 - 60% estudió hasta secundaria o menos.
 - 48% tiene hijos (2 en promedio). En el 60% de los casos, viven con el entrevistado.
 - Viven en familias de 3.9 miembros, de los que 1.9 trabajan.
 - 45% son de NSE medio-bajo y bajo; 45% de nivel medio; 10% de NSE medio-alto y alto.
 - 14% está desempleado. Quienes trabajan lo hacen sobre todo como empleados de una empresa, albañiles o se dedican a un oficio.
 - Los miembros de la familia con los que más personas cohabitan son, por orden de respuesta, la madre, hermanos, padre, pareja e hijos.
 - En promedio, hay 1.2 adictos en cada hogar, incluyendo al entrevistado. En el 80% de los casos, únicamente el encuestado ha tenido adicción a las drogas.
- Factores de protección:
 - Los amigos o amigas son las personas con quienes los entrevistados pasan más tiempo, seguido de la pareja.
 - Lo mismo respondieron cuando se les preguntó a quién tienen más confianza para contarles lo que sienten.
 - Sin embargo, consideran que quienes más los valoran son sus padres, seguido también de la pareja.
 - El sueño que más entrevistados comparten (16% del total) es el llegar a tener una casa propia.
 - Sin embargo, la gran mayoría hizo mención de aspectos que tienen qué ver con su superación personal: estudiar o tener una carrera, tener un negocio o hacerlo crecer, superarse profesionalmente, formar una familia o sacar adelante la que tiene, dejar las drogas, dar estudios a sus hijos y tener un empleo (o mejorar el actual).
 - Para alcanzar el sueño que tienen, planean trabajar mucho, hacer un mayor esfuerzo, dejar las drogas, estudiar, etc.
 - La gran mayoría (89%) de los que tienen un empleo o están estudiando, se sienten muy motivados o satisfechos con lo que hacen.
 - 17% practica algún deporte, sobre todo fútbol.

- Salud emocional / mental
 - Poco menos de la mitad (44%) afirmó sentirse triste con frecuencia o algunas veces. 37% dijo lo mismo en relación a sentimientos de angustia y 41% en cuanto a sentirse desesperado.
 - Uno de cada cinco (21%) dijo haber tenido cuadros de depresión (24% de ellos los tiene diariamente, 38% al menos una vez por mes).
 - Ese mismo porcentaje (21%) ha tenido pensamientos suicidas; 7% del total ha intentado suicidarse.
 - 8 de cada 10 no ha recibido ningún tipo de ayuda profesional. La mayoría de quienes sí han tenido ayuda, ha sido a través de apoyo psicológico, más que un tratamiento.
- Desarrollo de la adicción
 - Las sustancias de este tipo que más entrevistados saben que existen son, por orden de respuesta: marihuana, cocaína, cristal y heroína
 - La que más personas (67%) ha consumido es marihuana, seguida de cocaína (15%) y cristal (6%). La gran mayoría de los de menor edad (74%), inició con marihuana.
- En promedio, iniciaron el consumo a los 18 años (25% antes de los 16 años y 65% antes de los 19). Solo el 6% empezó a consumir droga después de los 25 años.
- Más de la mitad (59%) empezó a drogarse por decisión propia, sobre todo por curiosidad. 39% tuvo su primer contacto debido a que alguien le ofreció droga para que la probara, pero sin obligarlo(a).
- 55% solo ha consumido un tipo de droga, la primera que probó. Entre quienes han usado más de una, han consumido sobre todo cocaína y cristal como segunda droga.
- 57% de los que usaron marihuana como primera droga, no han consumido ninguna otra. 64% de los que iniciaron con cocaína o con cristal, no han probado una segunda.
- Casi 2/3 (65%) de los que han usado dos drogas, pasaron de la primera a la segunda en un año o menos (46% en un período de 6 meses o menor).
- Casi todos los de este grupo (85%) empezaron a consumir la segunda droga cuando aún usaban la primera, esto es, no dejaron de consumir con la que iniciaron.
- También el consumo de la segunda droga se dio básicamente por decisión propia, por la curiosidad de probarla.

- *Desarrollo de la adicción (continúa)*
 - En 6 de cada 10 casos, cuando los entrevistados empezaron a consumir droga, estaban pasando por un momento complicado en su vida: soledad, tristeza, depresión, la muerte de alguien cercano, problemas familiares, rechazo, etc.
 - En el resto de los casos, fue solo el deseo de probar la droga o integrarse a un grupo de amigos.
 - Casi 3 de cada 4 (73%) consume actualmente marihuana; 27% cocaína; 22% cristal, etc.
 - La gran mayoría (90%) los que consume marihuana, lo hace al menos una vez por semana. 36% la consume diariamente.
 - 71% de los que usan cocaína, lo hace al menos una vez por semana. Sin embargo, la droga más adictiva parece ser el cristal –sin considerar tabaco o alcohol-, ya que el 95% de quienes acostumbran usarla, la consumen al menos una vez por semana (41% diariamente).
 - Gasto semanal promedio estimado entre quienes consumen las drogas más comunes:
 - Marihuana: \$347.
 - Cocaína: \$513
 - Cristal: \$1,003
- Considerando todas las drogas que compra, en promedio gastan \$201 cada vez que compra, lo que equivale a \$695 por semana.
- Adicionalmente a las que compran, 1 de cada 4 entrevistados (25%) afirmó que en ocasiones le invitan a consumir drogas, sobre todo marihuana, cristal y cocaína. En la mayoría de estos casos, sobre todo de las dos primeras drogas, la invitación es al menos una vez por semana.
- Factores de riesgo
 - 14% ha pasado alguna vez situaciones complicadas para conseguir una droga, sobre todo robar, pedir dinero en la calle o prostituirse. La mitad vive esta situación al menos una vez por mes.
 - 25% indicó que además de sí mismo, hay al menos otra persona de su familia adicta a las drogas, en especial los hermanos, primos y pareja.
 - Por lo regular, cuando consumen drogas con alguien más, son las mismas que utiliza normalmente el entrevistado.
 - Por lo general, cuando la pareja usa drogas, consumen juntos. También es común que se droguen junto con sus hermanos y primos, pero no con la misma regularidad.

- Factores de riesgo (continúa)
 - Efectos nocivos de las drogas que más entrevistados dicen conocer: alucinaciones, problemas cardiacos, dolor de cabeza, cáncer, muerte, insomnio, locura, dependencia, daño mental, pérdida de memoria, ansiedad, nerviosismo, problemas respiratorios, aumento del apetito, vómito, etc.
 - Poco más de la mitad (53%) ha sufrido alguno de los problemas que mencionó, sobre todo alucinaciones (es el que más personas consideró el peor efecto), insomnio, dolor de cabeza, dependencia, aumento del apetito, ansiedad, vómito y problemas cardiacos.
 - 57% cree que el usar drogas ha afectado sobre todo a su entorno familiar. En menor medida (23%), piensa que ha afectado a su relación de pareja y a su entorno laboral.
 - Los problemas más comunes en este sentido son discusiones, enojos, regaños, molestia, rechazo, etc.
 - 54% afirmó que cuando consume drogas, también ingiere alimentos, sobre todo botanas, pero en general comen lo que tengan a la mano.
 - 15% ha cometido al menos un delito bajo el influjo de las drogas. Esto es más común entre los hombres y las personas de NSE medio-bajo y superior.
- 32% de los que han delinquido, tiene como consecuencia de ello antecedentes penales (5% del total).
- Uno de cada diez, ha sido hospitalizado debido a complicaciones con el uso de drogas (2.2 veces en promedio).
- 26% ha hecho el intento de dejar de consumir drogas (2.7 veces en promedio). Estas personas, en promedio han dejado de consumir hasta por 9 meses, cuando han intentado dejarlas, aunque la mayoría no ha pasado de 8 meses.
- Indican que no han podido dejar de usar drogas porque su adicción es muy fuerte, por las amistades o por falta de voluntad, principalmente.
- 15% ha estado internado en alguna clínica de rehabilitación (2.6 veces en promedio). 3 de cada 4 veces que se han internado, los entrevistados no han estado enteramente de acuerdo en hacerlo.
- Los entrevistados mencionaron 38 diferentes lugares donde se han internado para rehabilitación.
- Casi 8 de cada 10 que se han internado (78%), afirma que sí le recomendaría a alguien que lo requiera que se interne por su propia voluntad, sobre todo porque le puede ayudar a dejar las drogas, a rehabilitarse.

- Factores de riesgo (continúa)
 - Los que no recomiendan ingresar a un centro de rehabilitación es porque consideran que reciben malos tratos y porque no sirve si la persona no quiere cambiar.
 - Casi 2 de cada 3 (63%) ha tenido sentimientos de culpa por usar drogas, en especial por los conflictos y sufrimiento que provoca en familia y pareja que provoca, además de todos los problemas que implica para él mismo y otras personas.
 - Quienes no han sentido culpa es porque drogarse es algo que les gusta (les hace sentir bien) y creen que no hacen daño a nadie.
 - Las drogas que más entrevistados dijeron que nunca consumirían son heroína, cristal y cocaína, en ese orden.
 - Les parece que quienes consumen esas sustancias están haciendo algo malo, se hacen daño, son drogas muy fuertes.
 - Si tuvieran la oportunidad de hacerlo, 8 de cada 10 trataría de ayudar a alguien a salir de las drogas, sobre todo a amigos y familiares.
 - 61% cree que si de niño (6 a 8 años) hubiera tenido el apoyo de un programa que se enfocara a la atención de sus emociones, que le facilitara enfrentar sus decisiones, habría sido de ayuda para que pudiera evitar el consumo de drogas.
- Quienes opinan lo contrario es porque creen que de cualquier manera estarían consumiendo droga, cada uno toma sus propias decisiones, es una adicción, etc.
- En base a su experiencia, aconsejarían a niños y jóvenes no caer en la tentación de consumir drogas, alejarse de quienes se las ofrecen, de las malas amistades, informarse sobre la consecuencias, buscar apoyo, practicar deporte, etc.
- Finalmente, se pidió a los entrevistados calificar de 0 a 10 cada uno de una serie de enunciados, para indicar cuánto influye cada uno de ellos en el consumo de drogas, obteniéndose el siguiente ranking:
 1. Curiosidad de saber qué se siente (8.2 en una escala de 0 a 10)
 2. Querer pertenecer o sentirse parte de un grupo (5)
 3. Escapar del dolor, tensión o frustración (4.8)
 4. Descontento de su calidad de vida, ausencia de un proyecto de vida (4.3)
 5. Carencia de autoestima (3.6)
 6. Muerte o falta de algún familiar (2.2)
 7. Maltrato verbal (2.1)

- Aun cuando se trata de una encuesta con muestreo no probabilístico, los resultados nos pueden ayudar a identificar algunos aspectos relevantes sobre lo que viven las personas con adicción a la droga en las ciudades incluidas en el estudio.
- Aunque es un problema que afecta a todos los estratos poblacionales, encontramos que la escolaridad de las personas con adicción contactadas es relativamente baja (60% estudio hasta secundaria o menos), lo que de alguna manera coincide con la edad a la que muchos de ellos empezaron a consumir droga.
- No podemos hablar de causalidad, pero sí podríamos inferir que la labor para prevenir el consumo ha de realizarse a edades tempranas, antes de la secundaria y continuando hasta la preparatoria, partiendo de la edad en que los participantes refieren que empezaron a consumir:
 - 65% inició a los 18 años o antes, lo cual nos llevaría a considerar éste como un período de edad crítica que se debe atender para evitar caer en el consumo. Solo una minoría empieza después de los 25, lo que podría tomarse como punto de referencia para estimar que, pasada esa edad sin haber consumido, una persona muy probablemente no tendrá adicción a las drogas.
- Otros temas a resaltar:
 - Casi todos tienen sueños y planes para su vida y muchos, aunque no todos, entienden que el uso de las drogas interfiere con ellos.
 - Hace falta ayuda profesional, solo 2 de cada 10 la han recibido, lo cual es relevante si consideramos que en su gran mayoría, cuando empezaron a consumir, estaban pasando por alguna situación complicada en su vida.
 - Independientemente de lo anterior, el motivo principal que los lleva a consumir es la curiosidad, querer saber qué se siente.
 - La mayoría de las personas con una adicción no practican deporte.
 - El gasto en drogas, de casi \$3 mil mensuales en promedio, conlleva a situaciones complicadas, como es el tener que cometer un delito en algún momento.
 - La mayoría quisiera haber recibido orientación a una edad temprana y aconsejaría a otros no usar drogas, pero encontramos que hay un grupo considerable que no opina de esta manera, porque creen que no tienen un problema.



Anexos



EG MKTG.

www.egmercadotecnia.com

Sociedad Educadora de Sinaloa
Diagnóstico de adicción a las drogas en Sinaloa

¿Alguna vez has recibido algún tipo de ayuda profesional?

(% de los entrevistados de cada grupo)

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)

| Grupo | n = | No he recibido ningún tipo de ayuda profesional | Sí, he recibido apoyo psicológico | Sí, he recibido atención psiquiátrica | Sí, he recibido otro tipo de ayuda profesional |
|-----------|-----|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Femenino | 166 | 71% | 27% | 1% | 1% |
| Masculino | 344 | 85% | 14% | 1% | 0% |
| 12 a 17 | 35 | 80% | 14% | 3% | 3% |
| 18 a 29 | 156 | 83% | 15% | 1% | 1% |
| 30 a 39 | 164 | 82% | 16% | 3% | 0% |
| 40 a 49 | 75 | 77% | 21% | 0% | 0% |
| 50 a 59 | 63 | 71% | 29% | 0% | 0% |
| 60 a 65 | 17 | 88% | 12% | 0% | 0% |
| DE | 89 | 82% | 16% | 1% | 1% |
| D+ | 141 | 86% | 12% | 1% | 1% |
| C | 229 | 76% | 22% | 2% | 0.4% |
| ABC+ | 51 | 80% | 20% | 0% | 0% |



¿Cuál fue la PRIMERA sustancia que consumiste?

(% de los entrevistados de cada grupo)

Respuesta espontánea

| Grupo | n = | Marihuana | Cocaína | Cristal | Alcohol | Tabaco | Pastillas | Inhalantes | Heroína | Metanfetaminas | Jarabe | Polvo de Ángel |
|-----------|-----|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|------------|---------|----------------|--------|----------------|
| Femenino | 166 | 63% | 17% | 10% | 4% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% |
| Masculino | 344 | 69% | 14% | 5% | 5% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12 a 17 | 35 | 74% | 9% | 6% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 3% | 0% |
| 18 a 29 | 156 | 70% | 12% | 6% | 4% | 3% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 30 a 39 | 164 | 65% | 18% | 5% | 7% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 40 a 49 | 75 | 68% | 17% | 4% | 3% | 4% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 50 a 59 | 63 | 68% | 13% | 11% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 60 a 65 | 17 | 53% | 24% | 12% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DE | 89 | 61% | 18% | 8% | 1% | 1% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| D+ | 141 | 63% | 14% | 8% | 6% | 6% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% |
| C | 229 | 71% | 15% | 5% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0% |
| ABC+ | 51 | 75% | 12% | 6% | 2% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |



¿Qué edad tenías cuando la consumiste por primera vez?

(% de los entrevistados de cada grupo)

| Grupo | n = | 10 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 | Más de 35 | NC | PROMEDIO |
|-----------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----|----------|
| Femenino | 166 | 16% | 63% | 11% | 4% | 2% | 2% | 2% | 19.1 |
| Masculino | 344 | 30% | 56% | 11% | 2% | 1% | 0% | 1% | 17.6 |
| 12 a 17 | 35 | 66% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 15.2 |
| 18 a 29 | 156 | 28% | 68% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 16.5 |
| 30 a 39 | 164 | 21% | 60% | 14% | 5% | 1% | 0% | 0% | 18.5 |
| 40 a 49 | 75 | 15% | 55% | 23% | 3% | 3% | 3% | 0% | 19.6 |
| 50 a 59 | 63 | 17% | 60% | 13% | 5% | 2% | 3% | 0% | 19.8 |
| 60 a 65 | 17 | 29% | 29% | 24% | 0% | 12% | 0% | 6% | 19.8 |
| DE | 89 | 28% | 57% | 8% | 4% | 1% | 1% | 0% | 18.1 |
| D+ | 141 | 26% | 53% | 14% | 4% | 1% | 1% | 1% | 18.3 |
| C | 229 | 23% | 61% | 11% | 2% | 1% | 1% | 1% | 18.0 |
| ABC+ | 51 | 25% | 65% | 6% | 2% | 0% | 0% | 2% | 17.4 |



¿Cómo fue el primer consumo de esa sustancia?

(% de los entrevistados de cada grupo)

Respuesta asistida (se leyeron las opciones)

| Grupo | n = | Alguien me dijo que la probara, pero sin obligarme a hacerlo | Yo le pedí a alguien que me diera / yo decidí comprarla | Alguien me obligó a consumirla | Alguien me la dio sin darme cuenta |
|-----------|-----|--|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Femenino | 166 | 34% | 62% | 4% | 0% |
| Masculino | 344 | 41% | 57% | 2% | 0.3% |
| 12 a 17 | 35 | 43% | 57% | 0% | 0% |
| 18 a 29 | 156 | 37% | 60% | 3% | 1% |
| 30 a 39 | 164 | 38% | 60% | 2% | 0% |
| 40 a 49 | 75 | 44% | 51% | 5% | 0% |
| 50 a 59 | 63 | 41% | 57% | 2% | 0% |
| 60 a 65 | 17 | 18% | 76% | 6% | 0% |
| DE | 89 | 39% | 54% | 6% | 1% |
| D+ | 141 | 43% | 56% | 1% | 0% |
| C | 229 | 36% | 62% | 2% | 0% |
| ABC+ | 51 | 37% | 61% | 2% | 0% |



Sin importar lo que hayas hecho y con el mayor respeto y discreción te pregunto, ¿has cometido algún tipo de delito influenciado por las drogas?

(% de los entrevistados en cada grupo)

| Grupo | n = | Sí | No |
|-----------|-----|-----|-----|
| Femenino | 166 | 7% | 93% |
| Masculino | 344 | 20% | 80% |
| 12 a 17 | 35 | 11% | 89% |
| 18 a 29 | 156 | 14% | 86% |
| 30 a 39 | 164 | 16% | 84% |
| 40 a 49 | 75 | 19% | 81% |
| 50 a 59 | 63 | 16% | 84% |
| 60 a 65 | 17 | 12% | 88% |
| DE | 89 | 22% | 78% |
| D+ | 141 | 14% | 86% |
| C | 229 | 14% | 86% |
| ABC+ | 51 | 16% | 84% |



A consecuencia de ese o esos delitos, ¿cuentas con antecedentes penales?

(% de quienes han cometido algún delito de cada grupo)

| Grupo | n = | Sí | No |
|-----------|-----|-----|------|
| Femenino | 11 | 9% | 91% |
| Masculino | 68 | 35% | 65% |
| 12 a 17 | 4 | 0% | 100% |
| 18 a 29 | 22 | 32% | 68% |
| 30 a 39 | 27 | 33% | 67% |
| 40 a 49 | 14 | 50% | 50% |
| 50 a 59 | 10 | 20% | 80% |
| 60 a 65 | 2 | 0% | 100% |
| DE | 20 | 55% | 45% |
| D+ | 20 | 20% | 80% |
| C | 31 | 19% | 81% |
| ABC+ | 8 | 50% | 50% |



A consecuencia de las drogas que has consumido, ¿has sido hospitalizado(a) en alguna ocasión? Me refiero a estar en un hospital, no a una clínica de rehabilitación.

(% de los entrevistados en cada grupo)

| Grupo | n = | Sí | No |
|-----------|-----|-----|------|
| Femenino | 166 | 8% | 92% |
| Masculino | 344 | 11% | 89% |
| 12 a 17 | 35 | 9% | 91% |
| 18 a 29 | 156 | 8% | 92% |
| 30 a 39 | 164 | 14% | 86% |
| 40 a 49 | 75 | 9% | 91% |
| 50 a 59 | 63 | 10% | 90% |
| 60 a 65 | 17 | 0% | 100% |
| DE | 89 | 10% | 90% |
| D+ | 141 | 12% | 88% |
| C | 229 | 9% | 91% |
| ABC+ | 51 | 8% | 92% |

¿Cuántas veces ha estado hospitalizado?

(% de quienes han estado hospitalizados de cada grupo)

| Grupo | n = | 1 a 3 | 4 a 6 | Más de 6 | No recuerda | Promedio |
|-----------|-----|-------|-------|----------|-------------|----------|
| Femenino | 14 | 79% | 14% | 7% | 0% | 2.0 |
| Masculino | 37 | 78% | 19% | 0% | 3% | 2.2 |
| 12 a 17 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.0 |
| 18 a 29 | 12 | 75% | 25% | 0% | 0% | 2.1 |
| 30 a 39 | 23 | 70% | 22% | 4% | 4% | 2.5 |
| 40 a 49 | 7 | 86% | 14% | 0% | 0% | 2.3 |
| 50 a 59 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.5 |
| 60 a 65 | 0 | - | - | - | - | - |
| DE | 9 | 78% | 22% | 0% | 0% | 2.2 |
| D+ | 17 | 88% | 6% | 0% | 6% | 1.7 |
| C | 21 | 71% | 24% | 5% | 0% | 2.4 |
| ABC+ | 4 | 75% | 25% | 0% | 0% | 2.8 |



Hablando específicamente de centros o clínicas de rehabilitación, ¿alguna vez has estado internado en alguno de estos lugares?

(% de los entrevistados en cada grupo)

| Grupo | n = | Sí | No |
|-----------|-----|-----|-----|
| Femenino | 166 | 12% | 88% |
| Masculino | 344 | 17% | 83% |
| 12 a 17 | 35 | 14% | 86% |
| 18 a 29 | 156 | 17% | 83% |
| 30 a 39 | 164 | 13% | 87% |
| 40 a 49 | 75 | 16% | 84% |
| 50 a 59 | 63 | 21% | 79% |
| 60 a 65 | 17 | 6% | 94% |
| DE | 89 | 15% | 85% |
| D+ | 141 | 16% | 84% |
| C | 229 | 16% | 84% |
| ABC+ | 51 | 14% | 86% |



¿Cuántas veces ha estado internado?

(% de quienes han estado internados de cada grupo)

| Grupo | n = | 1 a 3 | 4 a 6 | Más de 6 | No recuerda | Promedio |
|-----------|-----|-------|-------|----------|-------------|----------|
| Femenino | 20 | 70% | 10% | 10% | 10% | 2.5 |
| Masculino | 59 | 75% | 15% | 7% | 3% | 2.6 |
| 12 a 17 | 5 | 80% | 0% | 0% | 20% | 1.3 |
| 18 a 29 | 26 | 77% | 15% | 4% | 4% | 2.3 |
| 30 a 39 | 22 | 68% | 23% | 9% | 0% | 2.9 |
| 40 a 49 | 12 | 92% | 0% | 8% | 0% | 2.4 |
| 50 a 59 | 13 | 54% | 15% | 15% | 15% | 3.3 |
| 60 a 65 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.0 |
| DE | 13 | 62% | 15% | 23% | 0% | 4.2 |
| D+ | 22 | 91% | 5% | 0% | 5% | 1.6 |
| C | 37 | 70% | 16% | 8% | 5% | 2.5 |
| ABC+ | 7 | 57% | 29% | 0% | 14% | 2.5 |



Te voy a leer algunas situaciones por las que posiblemente consumas alguna droga y dime qué tanto influyó cada situación para que las consumas.

Se leyó cada situación al entrevistado

Nivel de influencia promedio,
donde 0 es nada y 10 es mucho

n = 510

Promedio de los entrevistados de cada grupo




| Situación | Femenino | Masculino | 12 a 17 | 18 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 65 | DE | D+ | C | ABC+ |
|---|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|------|
| <i>n =</i> | 166 | 344 | 35 | 156 | 164 | 75 | 63 | 17 | 89 | 141 | 229 | 51 |
| Curiosidad de saber qué se siente | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 8.7 |
| Querer pertenecer o sentirse parte de un grupo de personas | 5.0 | 5.1 | 7.0 | 5.2 | 4.2 | 5.5 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.5 |
| Escapar del dolor, tensión o frustración | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.3 | 4.2 |
| Descontento de su calidad de vida, ausencia de proyecto de vida | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
| Carencia de autoestima | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 3.5 |
| Muerte o falta de algún familiar | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |
| Maltrato verbal por parte de alguien | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.2 |
| Narcocultura | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
| Maltrato físico por parte de un familiar (golpes) | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
| Parte de un tratamiento en su salud y se hizo adicto | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| Violación | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| Obligado por alguien a consumirla (en contra de su voluntad) | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |

Informe sobre la situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancia Psicoactivas en México

- En el estudio participaron 17,267 personas, de las cuales 62% (10,677) fueron mujeres y 37% (6,413) hombres, quienes contaron con una edad promedio de 40.9 años, siendo los estados de Guanajuato, Querétaro, Ciudad México, Durango y Estado de México las principales entidades de residencia (la muestra fue no probabilística).

Consumo de sustancias psicoactivas:

- En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, se preguntó a los participantes si habían consumido en los últimos 12 meses sustancias como alcohol, tabaco, drogas ilegales o medicamentos sin prescripción. 35.8% respondió que había consumido durante el último año alguna(s) de estas sustancias, de ellos 43.2% fueron hombres y 31.3% mujeres. Destaca que 60.5% de los participantes en la encuesta indicaron no haber consumido ninguna sustancia y 3.7% decidió no contestar.
- El orden de las sustancias con mayor consumo entre la población femenina y masculina fueron:
 - Alcohol (32.5%)
 - Tabaco (24.6%)
 - Marihuana (14.6%)
- En el caso de las mujeres, se identificó que 28.1% consumieron alcohol, 20.6% tabaco y 11.2% marihuana. 39.7% de los hombres consumieron alcohol, 31.2% tabaco y 20.2% marihuana, lo que indica que los hombres presentaron mayores prevalencias de consumo en comparación de las mujeres (Figura 10).



Fuente: Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2020

- Otros aspectos muy relevantes del estudio consistieron en saber si el consumo de sustancias en el contexto del confinamiento aumentó, disminuyó, si se abandonó, se mantuvo igual, o bien, si se inició durante ese periodo. En este sentido, mencionaron que el consumo de tabaco y alcohol se mantuvieron igual, 33.2% y 41.5% respectivamente. Por otro lado, el 59.9% de los consumidores de drogas ilegales haber dejado el consumo durante el confinamiento por COVID-19, probablemente debido a la dificultad de conseguir las sustancias.



3. Consumo de sustancias en población en general y grupos de riesgo

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT)

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 tuvo como objetivo evaluar las prevalencias globales y las principales variaciones estatales del consumo de sustancias psicoactivas en la población de 12 a 65 años que habitaban en viviendas particulares del país. En 2016 se entrevistó a 56,877 personas (12,440 fueron adolescentes de entre 12 y 17 años y 44,437 adultos de 18 a 65 años) y se visitaron 64,000 viviendas.

Entre la población general (12 a 65 años), el consumo de *cualquier droga en el último año*³ fue de 2.9% es decir que aproximadamente 2.5 millones de personas consumieron cualquier sustancia psicoactiva; el 4.6% fueron hombres (1.9 millones) y 1.3% mujeres (549,920), lo que representó un aumento estadísticamente significativo respecto a la prevalencia de consumo de cualquier droga en el último año registrada en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (Tabla 3).

Tabla 3. Consumo de cualquier droga en el último año, comparativa encuesta 2011 y 2016

| | ENA 2011 | | ENCODAT 2016-2017 | |
|----------------|----------|-----------|-------------------|-----------|
| | % | (PE) | % | (PE) |
| Hombres | 3.0 | 1,145,859 | 4.6* | 1,914,168 |
| Mujeres | 0.7 | 306,923 | 1.3* | 594,920 |
| Total | 1.8 | 1,452,782 | 2.9* | 2,509,088 |

*Aumento estadísticamente significativo respecto a los datos de 2011

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016- 2017



Prevalencias y tendencias del consumo de drogas

a) Población Total

En la población total, el consumo de cualquier droga, de drogas ilegales y de marihuana alguna vez en la vida ha aumentado significativamente entre el 2011 y el 2016, al pasar de 7.8%, 7.2% y 6% a 10.3%, 9.9% y 8.6% (respectivamente).

El consumo de las demás drogas se mantuvo estable. Esta situación se repite en ambos sexos, pues en hombres aumentó el consumo de cualquier droga de 13% a 16.2%, drogas ilegales de 12.5% a 15.8% y marihuana de 10.6% a 14%. En mujeres incrementa cerca de 2 veces el consumo de marihuana (de 1.6% en 2011 a 3.7% en 2016), y de drogas ilegales (de 2.3% a 4.3%) y en cualquier droga aumenta de 3% a 4.8% (Cuadro 1A).

Con respecto a las prevalencias de consumo de drogas en el último año, siguen el mismo patrón que las prevalencias de alguna vez; el consumo de cualquier droga incrementó de 1.8% a 2.9%, el de drogas ilegales pasó de 1.5% a 2.7% y el consumo de marihuana de 1.2% a 2.1% en la población total. En hombres aumentó el consumo de cualquier droga en el último año (3% en 2011 a 4.6% en 2016), de drogas ilegales (de 2.6% a 4.4%) y marihuana (de 2.2% a 3.5%); en las mujeres el crecimiento fue mayor, al triplicarse el consumo en la prevalencia de marihuana en el último año (de 0.3% a 0.9%) y de drogas ilegales (0.4% a 1.1%) y al duplicarse el consumo de cualquier droga de 0.7% a 1.3% (Cuadro 1B).

En cuanto a la dependencia a drogas en el último año, es reportada por el 0.6% de la población, (1.1% en hombres y 0.2% mujeres) y aunque existe una gran diferencia en los porcentajes entre ambos sexos, esta es más evidente en hombres (2%) y mujeres (0.3%) entre 18 y 34 años (Gráfica 1).

Cuadro 1A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 12 a 65 años

| | 2002 % | 2008 % | 2011 % | 2011 IC 95% | 2016 % | 2016 IC 95% |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Total | | | | | | |
| Mariguana | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 5.367-6.570 | 8.6* | 8.184-9.114 |
| Cocaína | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 2.828-3.680 | 3.5 | 3.231-3.819 |
| Crack | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.736-1.294 | 0.9 | 0.736-0.991 |
| Alucinógenos | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.451-0.945 | 0.7 | 0.542-0.825 |
| Inhalables | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.656-1.170 | 1.1 | 0.942-1.287 |
| Heroína | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.055-0.394 | 0.2 | 0.097-0.244 |
| Metanfetaminas | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.551-1.085 | 0.9 | 0.731-1.013 |
| Drogas Ilegales | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 6.568-7.864 | 9.9* | 9.372-10.391 |
| Cualquier Droga | 5.0 | 5.7 | 7.8 | 7.168-8.495 | 10.3* | 9.788-10.813 |
| Hombres | | | | | | |
| Mariguana | 6.9 | 7.2 | 10.6 | 9.499-11.692 | 14.0* | 13.130-14.804 |
| Cocaína | 2.2 | 4.1 | 5.9 | 5.111-6.774 | 6.2 | 5.624-6.727 |
| Crack | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.390-2.521 | 1.5 | 1.295-1.793 |
| Alucinógenos | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.671-1.589 | 1.0 | 0.756-1.228 |
| Inhalables | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.040-2.053 | 1.7 | 1.399-2.021 |
| Heroína | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.100-0.800 | 0.3 | 0.189-0.494 |
| Metanfetaminas | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.781-1.726 | 1.4 | 1.154-1.595 |
| Drogas Ilegales | 8.0 | 8.8 | 12.5 | 11.308-13.720 | 15.8* | 14.938-16.757 |
| Cualquier Droga | 8.6 | 9.1 | 13.0 | 11.793-14.215 | 16.2* | 15.240-17.062 |
| Mujeres | | | | | | |
| Mariguana | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.217-2.051 | 3.7* | 3.276-4.091 |
| Cocaína | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.489-0.981 | 1.1 | 0.856-1.244 |
| Crack | *** | 0.2 | 0.1 | 0.025-0.244 | 0.2 | 0.145-0.312 |
| Alucinógenos | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.072-0.515 | 0.4 | 0.232-0.559 |
| Inhalables | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.168-0.472 | 0.6 | 0.394-0.722 |
| Heroína | *** | *** | *** | --- | *** | --- |
| Metanfetaminas | *** | 0.2 | 0.4 | 0.124-0.697 | 0.4 | 0.243-0.562 |
| Drogas Ilegales | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 1.760-2.747 | 4.3* | 3.869-4.753 |
| Cualquier Droga | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 2.459-3.513 | 4.8* | 4.382-5.293 |

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.


***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.



**Cuadro 1B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 12 a 65 años**

| | 2002 | 2008 | 2011 | 2016 | | |
|-----------------|------|------|------|-------------|------|-------------|
| | % | % | % | IC 95% | % | IC 95% |
| Total | | | | | | |
| Mariguana | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.957-1.461 | 2.1* | 1.911-2.362 |
| Cocaína | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.351-0.643 | 0.8 | 0.632-0.971 |
| Crack | *** | 0.1 | 0.1 | 0.033-0.193 | 0.2 | 0.112-0.240 |
| Alucinógenos | *** | 0.1 | 0.1 | 0.010-0.146 | 0.2 | 0.086-0.233 |
| Inhalables | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.049-0.194 | 0.2 | 0.178-0.318 |
| Heroína | *** | *** | *** | --- | *** | 0.006-0.049 |
| Metanfetaminas | *** | 0.1 | 0.2 | 0.068-0.233 | 0.2 | 0.178-0.309 |
| Drogas Ilegales | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.229-1.782 | 2.7* | 2.417-2.947 |
| Cualquier droga | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.529-2.120 | 2.9* | 2.670-3.216 |
| Hombres | | | | | | |
| Mariguana | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.717-2.657 | 3.5* | 3.032-3.871 |
| Cocaína | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.636-1.211 | 1.4 | 1.055-1.729 |
| Crack | *** | 0.2 | 0.2 | 0.055-0.379 | 0.3 | 0.165-0.406 |
| Alucinógenos | *** | 0.1 | 0.1 | 0.005-0.275 | 0.2 | 0.132-0.296 |
| Inhalables | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.066-0.336 | 0.4 | 0.263-0.523 |
| Heroína | *** | 0.1 | *** | --- | 0.1 | 0.008-0.098 |
| Metanfetaminas | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.103-0.346 | 0.4 | 0.271-0.510 |
| Drogas Ilegales | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.126-3.147 | 4.4* | 3.897-4.906 |
| Cualquier droga | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.435-3.516 | 4.6* | 4.139-5.160 |
| Mujeres | | | | | | |
| Mariguana | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.084-0.502 | 0.9* | 0.710-1.107 |
| Cocaína | *** | 0.1 | 0.1 | 0.027-0.169 | 0.2 | 0.157-0.342 |
| Crack | --- | *** | *** | --- | 0.1 | 0.024-0.124 |
| Alucinógenos | *** | *** | *** | --- | 0.1 | --- |
| Inhalables | *** | *** | *** | --- | 0.1 | 0.054-0.173 |
| Heroína | --- | *** | --- | --- | *** | --- |
| Metanfetaminas | *** | 0.1 | 0.1 | --- | 0.1 | 0.044-0.169 |
| Drogas Ilegales | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.200-0.692 | 1.1* | 0.867-1.286 |
| Cualquier droga | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.470-1.023 | 1.3* | 1.113-1.585 |



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.





EGMKTG.

Lago Texcoco 3246, Lomas del Boulevard,
80110 Culiacán, Sinaloa.

(667) 716 3317 | 716 6210 | 716 6211